

Zāļu apraksts

1 Zāļu nosaukums

Zeel T ziede

2 Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs

100 g ziedes satur aktīvās vielas:

Cartilago suis	D 2	0,001	g
Funiculus umbilicalis suis	D 2	0,001	g
Embryo suis	D 2	0,001	g
Placenta suis	D 2	0,001	g
Toxicodendron quercifolium	D 2	0,27	g
Arnica montana	D 2	0,3	g
Solanum dulcamara	D 2	0,075	g
Symphytum officinale	D 8	0,75	g
Sanguinaria canadensis	D 2	0,225	g
Sulfur	D 6	0,27	g
Nadidum	D 6	0,01	g
Coenzymum A	D 6	0,01	g
Acidum alpha-liponicum	D 6	0,01	g
Natrium diethyloxalaceticum	D 6	0,01	g
Acidum silicicum	D 6	1	g

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3 Zāļu forma

Ziede.

Zeel T ir baltas līdz dzeltenīgi baltas krāsas mīksta ziede.

4 Klīniskā informācija

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Degeneratīvi procesi locītavās (artrozes- īpaši ceļu locītavās; poliartroze, spondiloartroze) un reimatiskās locītavu slimības (pleca-lāpstiņas periartrīts).

4.2 Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.

Parasti ziedi uzklāj plānā kārtiņā slimajiem apvidiem un saudzīgi ierīvē ādā. Ceļu artrozes gadījumā izspiež no tūbiņas 4 – 5 cm ziedes ceļu locītavu apvidū.

Zeel T drošība un efektivitāte bērniem līdz 6 gadu vecumam nav noteikta. Dati nav pieejami.

4.3 Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret jebkuru šo zāļu sastāvdaļu, piemēram, arniku vai indīgo efeju.
Nelietot grūtniecības vai zīdīšanas periodā.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Cetilsteārilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem., kontakta dermatītu). Izvairīties no iekļūšanas acīs, uz gļotādām, vaļējām brūcēm vai uz bojātas ādas.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ziņojumi par zāļu mijiedarbību nav saņemti, kā arī, ņemto vērā homeopātiskos atšķaidījumus, tādi nav sagaidāmi.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Nelietot grūtniecības vai zīdīšanas periodā.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Zeel T neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Ļoti reti (retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) var rasties alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas.

4.9 Pārdozēšana

Nav saņemti ziņojumi par pārdozēšanas gadījumiem.

5 Farmakoloģiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3 Pirmsklīniskie dati par drošību

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6 Farmaceitiskā informācija

6.1 Palīgvielu saraksts

Emulgators, cetilsteārilspirts, vazelinēļļa, baltais vazelīns, attīrīts ūdens, etilspirts.

6.2 Nesaderība

Nav zināma.

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no tiešas saules staru iedarbības.

Aizvērt tūbiņu uzreiz pēc lietošanas.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

6.5 Iepakojuma veids un sastāvs

Tūbiņas / kartona kārba.

Tūbiņās pa 50 un 100g.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par rīkošanos
Nav īpašu prasību.

7 Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.de

8 Reģistrācijas apliecības numurs:

97-0115

9 Reģistrācijas /Pārreģistrācijas datums:

Reģistrācijas datums: 09.04.1997

Pēdējais pārreģistrācijas datums: 05.12.2007

10 Teksta (daļējas) pārskatīšanas datums:

08/2011