

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Cralonin pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Homeopātiskās zāles

Aktīvās vielas: *Crataegus* Ø 70 g, *Spigelia anthelmia* D2, *Kalium carbonicum* D3

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto **Cralonin** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.
- Ja 2 nedēļu laikā Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

- 1. Kas ir Cralonin un kādam nolūkam tos lieto**
- 2. Pirms Cralonin lietošanas**
- 3. Kā lietot Cralonin**
- 4. Iespējamās blakusparādības**
- 5. Kā uzglabāt Cralonin**
- 6. Sīkāka informācija**

1. KAS IR CRALONIN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Cralonin ir homeopātiskas zāles, ko lieto vecuma izraisītu sirds izmaiņu, sirds muskulatūras bojājuma seku un neiroģēnu sirdsdarbības traucējumu gadījumā.

2. PIRMS CRALONIN LIETOŠANAS

Nelietojiet Cralonin:

Ja Jums ir paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no **Cralonin** palīgvielām.

Īpaša piesardzība, lietojot Cralonin, nepieciešama šādos gadījumos:

Pacienti ar sirds mazspēju nedrīkst lietot šīs zāles bez konsultēšanās ar ārstu, kā arī šīs zāles nav paredzētas citu ārsta ieteikto zāļu aizvietošanai.

Ja Jums rodas elpas trūkums vai sāpes sirds apvidū, kas, iespējams, izstaro uz rokām, vēdera augšdaļu vai rīkli, vai, ja simptomi ir saistīti ar nemiera sajūtu, sliktu dūšu, vemšanu vai svīšanu, un stāvoklis neuzlabojas pusstundas laikā, Jums jāizsauc ārstu, jo ir nepieciešama neatliekamā palīdzība.

Pirms **Cralonin** lietošanas bērniem līdz 12 gadu vecumam, konsultējieties ar ārstu.

Citu zāļu lietošana:

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas grūtniecība un zīdīšanas periodā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Šīs zāles satur 45 tilp.% etilspirta (alkohola).

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zāles satur 45 tilp.% etilspirta (alkohola). Etilspirts ietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Cralonin sastāvdaļām

Šīs zāles satur 45 tilp.% etilspirta (alkohola), t.i., līdz 178 mg vienā devā (10 pilienos), kas atbilst 4,5 ml alus vai 1,88 ml vīna vienā devā. Kaitīgs alkoholiķiem. Piesardzība jāievēro grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā, bērniem un augsta riska grupas pacientiem, piemēram, ar aknu slimību vai epilepsiju.

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol (39 mg) kālija katrā dienas devā. Būtībā tās ir kāliju nesaturējošas.

3. KĀ LIETOT CRALONIN

Vienmēr lietojiet **Cralonin** tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārstam jānosaka deva atbilstoši pacienta individuālajām vajadzībām.

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti lieto pa 10-20 pilieniem 3 reizes dienā. Akūtu traucējumu gadījumā pa 10 pilieniem ik pēc 15 minūtēm, līdz 12 reizēm dienā.

Uzmanību: nelietojiet maksimālās zāļu devas ilgāk kā 2 dienas, nekonsultējoties ar ārstu.

Gados vecākiem cilvēkiem vai pacientiem ar nieru darbības traucējumiem īpaša devu pielāgošana nav nepieciešama.

Ja esat lietojis Cralonin vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Cralonin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Cralonin

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, **Cralonin** var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Sākotnējā homeopātiskā pasliktināšanās ļoti retos gadījumos (tas ir, skar mazāk nekā 1 no 10 000 lietotāju) var izraisīt pārejošu sejas piesarkumu (pietvīkumu), tahikardiju un paātrinātu sirdsdarbību, tūskas veidošanos vai reiboni, sliktu dūšu un vieglus kuņģa darbības traucējumus.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT CRALONIN

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles etiķetes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Cralonin satur:

100 g šķīduma satur aktīvās vielas:

Crataegus Ø 70 g, Spigelia anthelmia D2 1 g, Kalium carbonicum D3 1 g

Palīgvielas: Etilspirts, attīrīts ūdens.

Cralonin ārējais izskats un iepakojums:

Saskaņots ZVA 29.12.2011.

Cralonin ir dzidrs (var rasties vieglas nogulsnes), tumši kastaņbrūns šķīdums.
Kartona kastītē ir brūna stikla pudelīte ar pilinātāju un polipropilēna skrūvējamu vāciņu.
Pudelītes kaklā ievietotais pilinātājs sastāv no polietilēna.
Pilinātājpudelīte satur 30 ml šķīduma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.de

Lai iegūtu vairāk informācijas par šīm zālēm, lūdzu, jautāriet reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējiem pārstāvjiem:

UAB Farmahelis

Partizānu 198-5

50324 Kauņa

Lietuva

Tālrunis, fakss: 0037037-452559

E-pasts: farmahelis@kaunas.omnitel.net

Šī lietošanas instrukcija akceptēta :