

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Viburcol supozitoriji bērniem un zīdaiņiem

Homeopātiskas zāles

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto Viburcol rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu bērna veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jūsu bērnam izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Viburcol un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Viburcol lietošanas
3. Kā lietot Viburcol
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Viburcol
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR VIBURCOL UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Supozitoriji bērniem un zīdaiņiem nemiera stāvokļa ar drudzi vai bez tā novēršanai; simptomātiskai parastu infekciju ārstēšanai.

2. PIRMS VIBURCOL LIETOŠANAS

Nelietojiet Viburcol šādos gadījumos:

Nelietot, ja ir paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai palīgvielām, pret Chamomilla, vai pret kādu no kurvjziežu dzimtas augiem.

Citu zāļu lietošana:

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras Jūsu bērns lieto vai pēdējā laikā lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Viburcol lietošana kopā ar uzturu

Mijiedarbība nav novērota.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Viburcol sastāvdaļām

Nav.

3. KĀ LIETOT VIBURCOL

Vienmēr lietojiet Viburcol tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Akūtu traucējumu gadījumā 1 supozitoriju ievada anālā atverē, nepieciešamības gadījumā to atkārti; veselības stāvoklim uzlabojoties, lieto pa 1 supozitorijam 2-3 reizes dienā. Zīdaiņiem (no 1. dzīves dienas) līdz 6 mēnešu vecumam maksimālā deva ir 1 supozitorijs 2 reizes dienā.

Ja esat lietojis Viburcol vairāk nekā noteikts

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Viburcol

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Viburcol

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Viburcol var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Retos gadījumos iespējamas alerģiskas ādas reakcijas.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT Viburcol

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Viburcol satur:

1 supozitorijs pa 1,1 g satur aktīvās vielas:

Chamomilla recutita	D1	1,1 mg
Atropa belladonna	D2	1,1 mg
Solanum dulcamara	D4	1,1 mg
Plantago major	D3	1,1 mg
Pulsatilla pratensis	D2	2,2 mg
Calcium carbonicum Hahnemanni	D8	4,4 mg

Palīgvielas: *cietie tauki.*

Viburcol ārējais izskats un iepakojums:

Iepakojumā 12 supozitoriji pa 1,1 g.

Garenas formas supozitoriji ar gludu virsmu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,
D – 76532 Baden-Baden
Vācija

Izplatītājs:

SIA "Farmahelis"
Partizānu 198-5
50324 Kauņa
Lietuva

Teksta pēdējās revīzijas datums: 10.09.2009.