

## Zāļu apraksts

**1 Zāļu nosaukums***Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums***2 Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs**

100 g šķīduma satur aktīvās vielas:

<i>Myosotis arvensis</i>	D3	5 g
<i>Veronica officinalis</i>	D3	5 g
<i>Teucrium scorodonia</i>	D3	5 g
<i>Pinus sylvestris</i>	D4	5 g
<i>Gentiana lutea</i>	D5	5 g
<i>Equisetum hyemale</i>	D4	5 g
<i>Sarsaparilla</i>	D6	5 g
<i>Scrophularia nodosa</i>	D3	5 g
<i>Juglans regia</i>	D3	5 g
<i>Calcium phosphoricum</i>	D12	5 g
<i>Natrium sulfuricum</i>	D4	5 g
<i>Fumaria officinalis</i>	D4	5 g
<i>Levothyroxinum</i>	D12	5 g
<i>Araneus diadematus</i>	D6	5 g
<i>Geranium robertianum</i>	D4	10 g
<i>Nasturtium officinale</i>	D4	10 g
<i>Ferrum iodatum</i>	D12	10 g

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

**3 Zāļu forma***Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums.**Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai* ir dzidrs, viegli gaiši dzeltens līdz gaiši dzeltens šķīdums.**4 Klīniskā informācija****4.1 Terapeitiskās indikācijas**

Limfātisms (tieksme uz limfātisko orgānu hipertrofiju, tūskas veidošanos un samazināta pretestības spēja infekcijām); dziedzeru pietūkums; mandeļu hipertrofija un hronisks tonsilīts.

**4.2 Devas un lietošanas veids**

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Parasti lieto pa 15-20 pilieniem 3 reizes dienā.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 5 pilieniem 3 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 7 pilieniem 3 reizes dienā.

Dodot bērniem, pilienus var piepildināt nelielam ūdens daudzumam.

**4.3 Kontrindikācijas**

Paaugstināta jutība pret kādu aktīvo vielu vai kādu no palīgvielām.

Nelietot vairogdziedzera slimību gadījumā bez ārsta uzraudzības.

**4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā**

Satur 35 vol.-% etilspirtu, t.i., līdz 150,2 mg vienā devā (10 pilienus), kas atbilst 3ml alus vai 1,27 ml vīna vienā devā (pieņemot, ka 5% un 12% tilpuma etilspirta attiecīgi) vai 49,73 ml ābolu

sulas. Kaitīgs alkoholiķiem. Piesardzība jāievēro grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā, bērniem un pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi  
Nav novērota.

4.6 Grūtniecība un zīdīšana  
Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un zīdīšanas laikā nav pieejami. Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus  
Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības  
Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas.

4.9 Pārdozēšana  
Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem

## **5 Farmakoloģiskās īpašības**

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.  
ATĶ kods V03AX

5.1 Farmakodinamiskās īpašības  
Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības  
Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3 Preklīniskie dati par drošību  
Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

## **6 Farmaceutiskā informācija**

6.1 Palīgvielu saraksts  
Etilspirts, attīrīts ūdens.

6.2 Nesaderība  
Nav piemērojama.

6.3 Uzglabāšanas laiks  
5 gadi.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi  
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5 Iepakojuma veids un saturs  
Pilinātājpudelīte/kartona kārba. Iepakojumā pilinātājpudelīte pa 30 ml.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai  
Nav īpašu prasību.

**7 Reģistrācijas apliecības īpašnieks:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str.2-4,  
D-76532 Baden-Baden  
Vācija

**8 Reģistrācijas numurs:**

00-0109

**9 Reģistrācijas /Pārreģistrācijas datums:**

16.02.2000

08.03.2005

**10 Teksta pēdējās pārskatīšanas datums:**

29.03.2010.