

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Traumeel S tabletes

Homeopātiskas zāles

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto **Traumeel S** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsažinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir **Traumeel S** un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms **Traumeel S** lietošanas
3. Kā lietot **Traumeel S**
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt **Traumeel S**
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR Traumeel S UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Traumeel S ir homeopātisks zāļu preparāts, ko lieto traumu ārstēšanā, piemēram, šādos gadījumos: sastiepumi, izmežģījumi, sasitumi, asinsizplūdumi un asinsizplūdumi locītavās, lūzumi; pēcoperācijas un posttraumatiska tūska un mīksto audu pietūkums; iekaisuma procesi un deģeneratīvi procesi, kas saistīti ar dažādu orgānu un audu iekaisumu, sevišķi balsta un kustību sistēmā (tendovaginīts, stiloidīts, epikondilīts, bursīts, skapulohumerāls periartīts); gūžas, ceļa un sīko locītavu artroze; akūts smadzeņu satricinājums.

2. PIRMS Traumeel S LIETOŠANAS

Nelietojiet Traumeel S šādos gadījumos:

Nelietot, ja ir paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai palīgvielām, pret Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium vai pret kādu no kurvjziežu dzimtas augiem. Principā Echinacea nedrīkst lietot, ja ir progresējošas sistēmiskas slimības, piemēram, tuberkuloze, leikoze vai leikozei līdzīgas slimības, saistaudu iekaisuma slimības (kolagenozes) autoimūnas slimības, multiplā skleroze, AIDS, HIV infekcijas vai citas hroniskas vīrusu slimības.

Citu zāļu lietošana:

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Traumeel S lietošana kopā ar uzturu

Mijiedarbība nav novērota.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Homeopātiski vielu atšķaidījumi nav toksiski, lietojot grūtniecības vai zīdīšanas laikā. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Traumeel S sastāvdaļām

Satur laktozi. Ja jums ārsti ir teicis, ka jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

3. KĀ LIETOT Traumeel S

Vienmēr lietojiet **Traumeel S** tieši tā, kā ārsts jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parasti lieto pa 1 tableti 3 reizes dienā, izšķīdinot tableti mutē.

Nav pietiekošas pieredzes par lietošanu bērniem līdz 12 gadu vecumam, tādēļ lietot tikai pēc ārsta konsultācijas.

Ja esat lietojis Traumeel S vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Traumeel S

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Traumeel S

Ja jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Traumeel S var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas, Retos gadījumos var rasties paaugstinātas jutības reakcijas vai alerģiskas ādas reakcijas (apsārtums, tūska un nieze) cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret kurvjziežiem (Kalnu arniku, Kumelītēm, Parasto pelašķi), un retos gadījumos šo zāļu lietošana jāpārtrauc. Pēc Echinacea ekstraktu saturošu zāļu lietošanas novēroti ādas izsitumi un nieze un retos gadījumos – sejas tūska, elpas trūkums (dispnoja) reibonis un asinsspiediena pazemināšanās. Pēc lietošanas var rasties pastiprināta siekalu izdalīšanās, un arī šādā gadījumā zāļu lietošana jāpārtrauc. Dažos gadījumos var rasties alerģiskas reakcijas arī sastāvā ietilpstošās homeopātiskās sastāvdaļas Mercurius solubilis dēļ.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT Traumeel S

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Traumeel S satur:

1 tablete satur aktīvās vielas:

Arnica montana	D2	15 mg
Calendula officinalis	D2	15 mg
Hamamelis virginiana	D2	15 mg
Achillea millefolium	D3	15 mg
Atropa belladonna	D4	75 mg
Aconitum napellus	D3	30 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni	D8	30 mg
Hepar sulfuris	D8	30 mg
Chamomilla recutita	D3	24 mg
Symphytum officinale	D8	24 mg
Bellis perennis	D2	6 mg
Echinacea	D2	6 mg

Echinacea purpurea	D2	6 mg
Hypericum perforatum	D2	3 mg

Citas sastāvdaļas: laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

Traumeel S ārējais izskats un iepakojums:

Iepakojumā 50 tabletes.

Baltas, apaļas tabletes ar šķautni.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,
D – 76532 Baden-Baden
Vācija

Izplatītājs:

SIA "Farmahelis"
Partizānu 198-5
50324 Kauņa
Lietuva

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 14.09.2009.