

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

### **Angin – Heel S tabletes**

Homeopātiskas zāles

**Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto **Angin – Heel S tabletes** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsažinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

#### **Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir **Angin – Heel S tabletes** un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms **Angin – Heel S tabletes** lietošanas
3. Kā lietot **Angin – Heel S**
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt **Angin – Heel S tabletes**
6. Sīkāka informācija

### **1. KAS IR Angin – Heel S tabletes UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO**

**Angin-Heel S tabletes** ir homeopātiskas zāles, ko lieto atbalstošai terapijai, ārstējot rīkles mandeļu iekaisumu, kas noris ar apgrūtinātu rīšanu, sāpēm un apsārtumu.

### **2. PIRMS Angin – Heel S tabletes LIETOŠANAS**

**Nelietojiet Angin – Heel S tabletes šādos gadījumos:**

Nelietojiet Angin-Heel S tabletes, ja jums ir paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai kādu citu Angin-Heel S tabletes sastāvdaļu, piem., *Arnica* vai citiem kurvjziežu (*Asteraceae*) dzimtas augiem.

#### **Citu zāļu lietošana:**

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

#### **Grūtniecība un zīdīšanas periods**

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

#### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

#### **Svarīga informācija par kādu no Angin – Heel S tabletes sastāvdaļām**

Satur laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

### **3. KĀ LIETOT Angin – Heel S tabletes**

Vienmēr lietojiet **Angin – Heel S tabletes** tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 1 tablete jāizšķīdina mutē 3 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laikposmā).

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 līdz 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laikposmā).

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laikposmā).

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreīzu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam

**Ja esat lietojis Angin – Heel S tabletes vairāk nekā noteikts**

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

**Ja esat aizmirsis lietot Angin – Heel S tabletes**

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

**Ja Jūs pārtraucat lietot Angin – Heel S tabletes**

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

**4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Tāpat kā citas zāles, *Angin – Heel S* tabletes var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējama alerģiska reakcija vai pastiprināta siekalu sekrēcija pret homeopātiski aktīvo vielu *hydrargyrum bicyanatum* (mercury). Retos gadījumos var rasties paaugstinātas jutības reakcijas cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret kurvjziežu dzimtes augiem (Arniku). Šādā gadījumā zāļu lietošana jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

**5. KĀ UZGLABĀT Angin – Heel S tabletes**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

**6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA**

**Ko Angin – Heel S tabletes satur:**

1 tablete satur aktīvās vielas:

Hydrargyrum bicyanatum	D8	30 mg
<i>Phytolacca americana</i>	D4	30 mg
<i>Apis mellifica</i>	D4	30 mg
<i>Arnica montana</i>	D4	30 mg
<i>Hepar sulfuris</i>	D6	60 mg
<i>Solanum dulcamara</i>	D4	60 mg
<i>Atropa belladonna</i>	D4	60 mg

Palīgvielas: laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

**Angin – Heel S tabletes ārējais izskats un iepakojums:**

Iepakojumā pa 50 tabletēm.

*Angin – Heel S* tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:**

**Izplatītājs:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,  
76532 Baden-Baden  
Vācija  
Telefons: 0049 7221 501-00  
fax: 0049 7221 501 485  
E-pasts: [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Saskaņots ZVA 03.06.2010.  
SIA "Farmahelis"  
Partizānu 198-5  
50324 Kauņa  
Lietuva  
Telefons, fax: 0037037-452559  
E-pasts: [farmahelis@kaunas.omnitel.net](mailto:farmahelis@kaunas.omnitel.net)

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums:20.03.2010.