

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Homeopātiskas zāles

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsažinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai** un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai** lietošanas
3. Kā lietot *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai**
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai**
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO**
Lymphomyosot **pilieni iekšķīgai lietošanai** ir homeopātiskas zāles, ko lieto, ja ir limfātisms (tieksme uz limfātisko orgānu hipertrofiju, tūskas veidošanos un samazināta pretestības spēja infekcijām); dziedzeru pietūkums; mandeļu tūska un hronisks tonsilīts.

2. PIRMS *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai LIETOŠANAS**
Nelietojiet *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai:**

Ja jums ir paaugstināta jutība pret kādu aktīvo vielu vai jebkuru citu *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai** palīgvielu.

Nelietot vairogdziedzera slimību gadījumā bez ārsta uzraudzības.

Citu zāļu lietošana:

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai sastāvdaļām**

Satur 35 vol.-% etilspirtu, t.i., līdz 150,2 mg vienā devā (10 pilienus), kas atbilst 3ml alus vai 1,27 ml vīna vienā devā (pieņemot, ka 5% un 12% tilpuma etilspirta attiecīgi) vai 49,73 ml ābolu sulas. Kaitīgs alkoholiķiem. Piesardzība jāievēro grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā, bērniem un pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

3. KĀ LIETOT *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai**

Vienmēr lietojiet *Lymphomyosot* **pilieni iekšķīgai lietošanai** tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Parasti lieto pa 15-20 pilieniem 3 reizes dienā.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 5 pilieniem 3 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 7 pilieniem 3 reizes dienā.

Dodot bērniem, pilienus var piepilināt nelielam ūdens daudzumam.

Ja esat lietojis *Lymphomyosot* pilieni iekšķīgai lietošanai vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot *Lymphomyosot* pilieni iekšķīgai lietošanai

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot *Lymphomyosot* pilieni iekšķīgai lietošanai

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, *Lymphomyosot* pilieni iekšķīgai lietošanai var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos iespējamas alerģiskas reakcijas.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT *Lymphomyosot* pilieni iekšķīgai lietošanai

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko *Lymphomyosot* pilieni iekšķīgai lietošanai satur:

100 g šķīduma satur aktīvās vielas:

<i>Myosotis arvensis</i>	D3	5 g
<i>Veronica officinalis</i>	D3	5 g
<i>Teucrium scorodonia</i>	D3	5 g
<i>Pinus sylvestris</i>	D4	5 g
<i>Gentiana lutea</i>	D5	5 g
<i>Equisetum hyemale</i>	D4	5 g
<i>Sarsaparilla</i>	D6	5 g
<i>Scrophularia nodosa</i>	D3	5 g
<i>Juglans regia</i>	D3	5 g
<i>Calcium phosphoricum</i>	D12	5 g
<i>Natrium sulfuricum</i>	D4	5 g
<i>Fumaria officinalis</i>	D4	5 g
<i>Levothyroxinum</i>	D12	5 g
<i>Araneus diadematus</i>	D6	5 g
<i>Geranium robertianum</i>	D4	10 g
<i>Nasturtium officinale</i>	D4	10 g
<i>Ferrum iodatum</i>	D12	10 g

Citas sastāvdaļas: Etilspirts, attīrīts ūdens.

***Lymphomyosot* pilieni iekšķīgai lietošanai ārējais izskats un iepakojums:**

Pilinātājpudelīte pa 30 ml.

***Lymphomyosot* pilieni iekšķīgai lietošanai** ir dzidrs, viegli gaiši dzeltens līdz gaiši dzeltens šķīdums.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Izplatītājs:

SIA "Farmahelis"

Saskaņots ZVA 03.06.2010.

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,
76532 Baden-Baden
Vācija
Telefons: 0049 7221 501-00
fax: 0049 7221 501 485
E-pasts: info@heel.de

Partizānu 198-5
50324 Kauņa
Lietuva
Telefons, fax: 0037037-452559
E-pasts: farmahelis@kaunas.omnitel.net

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 29.03.2010.