

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Lymphomyosot tabletes

Homeopātiskas zāles.

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto Lymphomyosot tabletes rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsaazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Lymphomyosot tabletes un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Lymphomyosot tabletes lietošanas
3. Kā lietot Lymphomyosot tabletes
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Lymphomyosot tabletes
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR LYMPHOMYOSOT TABLETES UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Lymphomyosot tabletes ir homeopātiskas zāles, ko lieto limfātisma (ar tieksmi uz limfātisko orgānu hipertrofiju, tūskas veidošanos un samazinātu pretestības spēju infekcijām), dziedzeru pietūkuma, mandeļu tūskas un hroniska tonsilīta gadījumā.

2. PIRMS LYMPHOMYOSOT TABLETES LIETOŠANAS

Nelietojiet Lymphomyosot tabletes šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6.sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- nelietot vairogdziedzera slimību gadījumā bez ārsta uzraudzības.

Citu zāļu lietošana:

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Lymphomyosot tabletes sastāvdaļām

Satur laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

3. KĀ LIETOT LYMPHOMYOSOT TABLETES

Vienmēr lietojiet Lymphomyosot tabletes tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: pa 3 tabletēm 3 reizes dienā, izšķīdinot tabletes mutē.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 līdz 2 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā.

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreižu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam

Ja esat lietojis Lymphomyosot tabletes vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Lymphomyosot tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Lymphomyosot tabletes

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Lymphomyosot tabletes var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos var būt alerģiskas reakcijas.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT LYMPHOMYOSOT TABLETES

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Lymphomyosot tabletes satur:

1 tablete satur aktīvās vielas:

Myosotis arvensis	D3	15 mg
Veronica officinalis	D3	15 mg
Teucrium scorodonia	D3	15 mg
Pinus sylvestris	D4	15 mg
Gentiana lutea	D5	15 mg
Equisetum hyemale	D4	15 mg
Sarsaparilla	D6	15 mg

Scrophularia nodosa	D3	15 mg
Juglans regia	D3	15 mg
Calcium phosphoricum	D12	15 mg
Natrium sulfuricum	D4	15 mg
Fumaria officinalis	D4	15 mg
Levothyroxinum	D12	15 mg
Araneus diadematus	D6	15 mg
Geranium robertianum	D4	30 mg
Nasturtium officinale	D4	30 mg
Ferrum iodatum	D12	30 mg

Citas sastāvdaļas: magnija stearāts, laktozes monohidrāts.

Lymphomyosot tabletes ārējais izskats un iepakojums:

Iepakojumā pa 50 tabletēm.

Lymphomyosot tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni. Var būt atsevišķi dzeltenbrūni līdz brūni punkti.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,
76532 Baden-Baden
Vācija

Izplatītājs:

SIA "Farmahelis"
Partizānu 198-5
50324 Kauņa,
Lietuva

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 04.03.2013.